



Département Licence

Année universitaire 2007/2008 Session 1 d'automne
Parcours : CSB3 UE : INF162
Épreuve : Probabilités pour l'Informatique
Date : 4 Janvier 2008 Heure : 8h30 Durée : 1h30
Documents : autorisés
Épreuve de Nasser Saheb

Indiquez votre code d'anonymat : No :

Barème

Questions : 6 points

Exercices 1, 2, 3 : chacun 7 points

Questions

(Justifier vos réponses)

1. Soient A et B deux événements de probabilité non nulle. Si $Pr(A \cap B) > Pr(A)Pr(B)$, que peut-on dire de $Pr(A/B)$ et de $Pr(B/A)$?
2. Deux événements exclusifs A et B (i.e. $A \cap B = \emptyset$) peuvent-ils être indépendants ?
3. Soient A et B deux événements associés à une expérience aléatoire, nous avons $Pr(A) = 0.30$, $Pr(A \cup B) = 0.70$ et $Pr(B) = p$. Déterminer p dans chacun des trois cas suivants :
 - A et B sont disjoints.
 - A et B sont indépendants.
 - On a $Pr(A \cap \overline{B}) = 0.20$.
 - Dans ce dernier cas (c'est-à-dire $Pr(A \cap \overline{B}) = 0.20$), A et B sont-ils disjoints ? indépendants ?

Solution

1. Puisque $Pr(A \cap B) = Pr(A) \times Pr(B/A)$, on en déduit $Pr(B/A) > Pr(B)$ (i.e. A "favorise" B). De même on a $Pr(A/B) > Pr(A)$
2. Si A et B sont indépendants, on a $Pr(A \cap B) = Pr(A) \times Pr(B)$. Mais alors, s'ils sont de plus exclusifs, $Pr(A \cap B) = 0$ et, donc, au moins l'un d'eux doit être de probabilité nulle.
3. • Si A et B sont disjoints, on a $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B)$ et, donc, $0.7 = 0.3 + p$. On en déduit $p = 0.4$.
• Si A et B sont indépendants, on a $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A) \times Pr(B)$. Donc $0.7 = 0.3 + p - p \times 0.3$. D'où $p = 4/7$.
• Si $Pr(A \cap \overline{B}) = 0.20$, alors $Pr(A \cap B) = Pr(A) - Pr(A \cap \overline{B}) = 0.1$. On en déduit $0.7 = 0.3 + p - 0.1$. D'où $p = 0.5$.
• Dans le dernier cas A et B ne peuvent pas être disjoints, puisque $Pr(A \cup B) = 0.1 \neq 0$. Ils ne peuvent pas être indépendants, non plus, puisque $Pr(A \cap B) = 0.1$ alors que $Pr(A) \times Pr(B) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$.

Choisissez 2 exercices parmi les 3 proposés

Exercice 1. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. On tire un mot w de longueur $n \geq 1$ sur A ; tous les 2^n mots ont la même probabilité d'être tirés.

1. Quelle est la probabilité pour que w soit palindrome ? (**Rappel :** Un mot est dit *palindrome* s'il est identique à son image miroir.) Vous pouvez considérer deux cas suivant la parité de n .
2. On répète l'expérience de tirage des mots de longueur n . Combien de fois faut-il répéter l'expérience pour que l'espérance du nombre de mots palindromes obtenus soit au moins égale à n ?
3. Quelle est la probabilité pour que $\|w|_a - |w|_b\| \leq 1$ (les nombres d'occurrences de a et celles de b dans w diffèrent au plus d'une unité) ?
4. Quelle est l'espérance du nombre d'occurrences de abb ?

Solution

1. Soit n pair, $n = 2k$. Pour le tirage d'un mot palindrome, les k premières lettres tirées peuvent être quelconques, mais la seconde moitié de w ne peut être que la copie de la première moitié tirée dans le sens inverse. Donc $pr(w \text{ palindrome}) = \frac{1}{2^k}$. Pour n impair, $n = 2k + 1$, par un raisonnement similaire, nous aurons $Pr(w \text{ palindrome}) = \frac{1}{2^k}$. Donc, dans tous les cas, la probabilité de tirage d'un mot w palindrome sur l'alphabet A vaut $2^{-\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ ($\lfloor x \rfloor$ est la valeur entière par défaut de x).
2. Soit N le nombre de répétitions. L'espérance du nombre de palindromes est $N \times 2^{-\lfloor n/2 \rfloor}$. Pour qu'elle vaille au moins n , on doit avoir $N \geq n 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.
3. Pour $n = 2k$, la probabilité recherchée est celle de tirer k occurrences de a et k occurrences de b (dans un ordre quelconque), c'est-à-dire :

$$\frac{\binom{k}{2k}}{2^n} = \frac{(2k)!}{k! k! 4^k}.$$

Pour $n = 2k + 1$, la probabilité recherchée est celle de tirer soit k occurrences de a et $k + 1$ occurrences de b soit $k + 1$ occurrences de a et k occurrences de b . Ces deux événements sont disjoints et de même probabilité. La probabilité recherchée vaut donc :

$$2 \times \frac{(2k+1)!}{k! (k+1)! 2^n} = \frac{(2k+1)!}{k! (k+1)! 4^k}.$$

4. On suppose $n \geq 3$. Soit i , $1 \leq i \leq n-2$, une position dans w . La probabilité d'avoir une occurrence de abb à partir de cette position est de $1/8$. On en déduit l'espérance du nombre d'occurrences de abb : $1/8 \times (n-2) = \frac{n-2}{8}$.

Exercice 2. Les demandes X_1, \dots, X_6 pour un hebdomadaire dans les journées de lundi à samedi peuvent être assimilées aux variables aléatoires indépendantes suivant les lois de Poisson de paramètres 30, 20, 10, 10, 5, 5 respectivement. Soit $X = \sum_{i=1}^6 X_i$ le nombre total de numéros vendus dans la semaine.

1. Déterminer la loi de la v.a. X . Quelle est sa fonction génératrice ?
2. En déduire l'espérance et la variance de X .
3. On choisit un jour de la semaine de lundi à samedi, en supposant que, *a priori* tous les 6 jours ont la même chance d'être choisis. Quelle est la probabilité conditionnelle (*a posteriori*) qu'il s'agisse d'un lundi, sachant que 40 numéros de l'hebdomadaire sont vendus ? (Il suffit d'écrire l'expression de probabilité et non la valeur numérique).

Solution

1. La somme des v.a. indépendantes de Poisson est une v.a. de Poisson dont le paramètre est la somme des paramètres. Donc X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 30 + 20 + 10 + 10 + 5 + 5 = 80$. La f.g. de X est $G(z) = e^{-\lambda(1-z)} = e^{-80(1-z)}$.
2. En dérivant la f.g. de X , on obtient : $G'(z) = 80e^{-80(1-z)}$ et $\mathbb{E}X = G'(1) = 80$. La variance est obtenue en retranchant le carré de $\mathbb{E}X = G'(1)$ de $G''(1) + G'(1)$. Nous avons : $\mathbb{V}X = 80^2 + 80 - 80^2 = 80$. Évidemment, on aurait pu utiliser le fait que l'espérance et la variance d'une distribution de Poisson sont égales (toutes les deux) au paramètre de la loi.
3. Désignons par $Pr(Lundi/X_1 = 40)$ cette probabilité conditionnelle. D'après le théorème de Bayes, on a :

$$\begin{aligned} Pr(Lundi/X_1 = 40) &= \frac{Pr(Lundi) \times Pr(X_1 = 40/Lundi)}{Pr(X_1 = 40)} \\ &= \frac{\frac{1}{6} \times e^{-30} \frac{30^{40}}{40!}}{\frac{1}{6} \times [e^{-30} \frac{30^{40}}{40!} + e^{-20} \frac{20^{40}}{40!} + 2 e^{-10} \frac{10^{40}}{40!} + 2 e^{-5} \frac{5^{40}}{40!}]} \\ &= \frac{e^{-30} 30^{40}}{e^{-30} 30^{40} + e^{-20} 20^{40} + 2e^{-10} 10^{40} + 2e^{-5} 5^{40}}. \end{aligned}$$

Exercice 3. Soit X une v.a. continue de densité :

$$f(x) = \begin{cases} ax(1-x) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Quelle est la valeur de a pour que f soit vraiment une densité ? Dans la suite, on suppose que a prend cette valeur.
2. Calculer la f.r. (fonction de répartition) de X .
3. Calculer l'espérance de X .
4. Quelle est la probabilité conditionnelle $Pr(X > \frac{3}{4} / X > \frac{1}{2})$?

Solution

1. Pour que $f(x)$ soit une densité de probabilité il faut que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. On en déduit $[\frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{3}ax^3]_0^1 = 1$. Et donc $a = 6$.
2. Soit $F(t)$ la f.r. de X . Un calcul simple montre que :

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 3t^2 - 2t^3 & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

3. L'espérance de X vaut $\int_0^1 6x^2(1-x)dx = \frac{6}{3} - \frac{6}{4} = 0.5$.
4. La probabilité conditionnelle recherchée vaut $\frac{Pr(X>\frac{3}{4})}{Pr(X>\frac{1}{2})} = \frac{1-F(3/4)}{1-F(1/2)} = \frac{1-3(3/4)^2+2(3/4)^3}{1-3(1/2)^2+2(1/2)^3} = 0.3125$.