

LOGIQUE

Sujet de contrôle continu- 30 Novembre 2009

Durée : 1H 30

Documents autorisés : notes de cours, feuilles et notes de TD.

Exercice 1(sur 4 points)

1- Donner des preuves dans LK des séquents suivants :

$$\begin{aligned} \neg(A \wedge B) &\vdash \neg A \vee \neg B \\ \neg A \vee \neg B &\vdash \neg(A \wedge B) \\ &\vdash \neg\neg(\forall x(P(x) \vee \neg P(x))) \\ &\vdash (\neg\exists xP(x)) \rightarrow (\forall x\neg P(x)) \end{aligned}$$

2- Donner une preuve dans LJ du quatrième séquent de la question 1.

Exercice 2(sur 3 points)

Le professeur Cosinus, qui est quelquefois distrait, pense avoir écrit une preuve dans LJ du séquent $\vdash \neg(A \vee \neg A)$.

- 1- Pourquoi cette preuve est-elle nécessairement incorrecte ?
- 2- Critiquer chaque étape de déduction de la preuve de Cosinus :

$$\frac{\frac{\frac{}{\perp \vdash} \perp_g \quad \frac{A \vdash A}{\vdash A} \text{ax}}{A \vdash} \text{aff}^* \quad \frac{}{\neg A \vdash} \neg_g}{A \vee \neg A \vdash} \vee_g}{\vdash \neg(A \vee \neg A)} \neg_d$$

Exercice 3(sur 3 points)

Soit Γ un multi-ensemble fini de formules et A, B deux formules telles que :

$$\Gamma \vdash_{\text{LK}} A \vee B \tag{1}$$

1- Montrer que l'affirmation (1) entraîne que le séquent $\Gamma \vdash \neg A \rightarrow B$ est, lui-aussi, prouvable dans LK.

2- Décrire, à partir d'une preuve π , dans LK, du séquent $\Gamma \vdash_{\text{LK}} A \vee B$, une preuve π' , dans LK, du séquent $\Gamma \vdash \neg A \rightarrow B$.

Attention : Γ peut ne pas être vide ; la dernière règle d'inférence utilisée par π n'est donc pas nécessairement \vee_d .

3- Supposons que la preuve π donnée ci-dessus soit sans-coupure. La preuve π' que vous décrivez en réponse à la question 2 est-elle sans-coupure ? peut-on construire, à partir de π' , une preuve π'' , dans LK, *sans-coupure*, du séquent $\Gamma \vdash \neg A \rightarrow B$?

Exercice 4(sur 10 points)

On rappelle que l'ensemble d'axiomes **P0** est formé de l'union de l'ensemble des axiomes de l'égalité (noté EG) avec l'ensemble des sept axiomes suivants :

A1 : $\forall x \neg S(x) = 0$

A2 : $\forall x (x = 0 \vee \exists y, x = S(y))$

A3 : $\forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y)$

A4 : $\forall x (x + 0 = x)$

A5 : $\forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y))$

A6 : $\forall x (x \times 0 = 0)$

A7 : $\forall x \forall y (x \times S(y) = x \times y + x)$

On considère la structure \mathcal{A} , dont le domaine est $A := \{0, 1, 2\}$ et où les symboles de fonctions $0, S, +$ sont interprétés comme suit :

$$0_{\mathcal{A}} := 0, S_{\mathcal{A}}(0) := 1, S_{\mathcal{A}}(1) := 2, S_{\mathcal{A}}(2) := 1$$

| $+_{\mathcal{A}}$ | 0 | 1 | 2 |
|-------------------|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 |

1- Vérifier que

$$\mathcal{A} \models A1 \wedge A2 \wedge A4 \wedge A5$$

2- Montrer que, ces interprétations de $0, S, +$ étant fixées, il n'existe qu'une interprétation possible $\times_{\mathcal{A}}$ du symbole de fonction binaire \times telle que

$$\mathcal{A} \models A6 \wedge A7$$

Donner la table de cette opération $\times_{\mathcal{A}}$.

3- Est-il vrai que

$$\mathcal{A} \models A3?$$

4- Le séquent $EG, A1, A2, A4, A5, A6, A7 \vdash A3$ est-il prouvable dans LK ? (donner une justification précise).

5- Le séquent $EG, A1, A2, A4, A5, A6, A7 \vdash \neg A3$ est-il prouvable dans LK ? (donner une justification précise).